

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

# Adiclair<sup>®</sup> Salbe

100.000 I.E/g

Zur Anwendung bei Erwachsenen, Kindern und Säuglingen

Wirkstoff: Nystatin



### Liebe Patientin, lieber Patient!

**Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ADICLAIR<sup>®</sup> jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist ADICLAIR<sup>®</sup> und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ADICLAIR<sup>®</sup> beachten?
3. Wie ist ADICLAIR<sup>®</sup> anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ADICLAIR<sup>®</sup> aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. Was ist ADICLAIR<sup>®</sup> und wofür wird es angewendet?

### 1.1 Wirkungsweise:

Das in ADICLAIR<sup>®</sup> enthaltene Nystatin wirkt spezifisch gegen Infektionserkrankungen mit *Candida albicans* und anderen Pilzen. Dabei wird Nystatin an die Zellmembranen gebunden, hemmt das Wachstum und zerstört die Pilzzellen.

### 1.2 ADICLAIR<sup>®</sup> wird angewendet:

Zur Behandlung von Hautinfektionen mit nystatinempfindlichen Hefepilzen, insbesondere Behandlung von Mykosen im Windelbereich (mykotische Windeldermatitis).

## 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ADICLAIR<sup>®</sup> beachten?

### 2.1 ADICLAIR<sup>®</sup> darf nicht angewendet werden

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Nystatin, oder einen der sonstigen Bestandteile von ADICLAIR<sup>®</sup>

### 2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung von ADICLAIR<sup>®</sup> ist erforderlich, wenn das Folgende zutrifft:

#### Kinder:

Aufgrund der hohen Osmolarität von Nystatin wird von einer Anwendung bei sehr untergewichtigen und unreifen Frühgeborenen abgeraten.

### 2.3 Bei Anwendung von ADICLAIR<sup>®</sup> mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

### 2.4 Schwangerschaft und Stillzeit:

Nystatin, der Wirkstoff in ADICLAIR<sup>®</sup>, wird in therapeutischer Dosis nach oraler Gabe, über die intakte Haut oder über die Schleimhäute kaum resorbiert. Nystatin passiert die Plazentaschranke nicht, und ein Übertritt in die Muttermilch ist ebenfalls nicht zu erwarten.

ADICLAIR<sup>®</sup> kann während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

### 2.5 Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.



### 3. Wie ist ADICLAIR® anzuwenden?

Wenden Sie ADICLAIR® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### 3.1 Dosierung:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:  
ADICLAIR® 2–3-mal täglich anwenden, in schweren Fällen auch häufiger.

#### 3.2 Art der Anwendung:

Zum Auftragen auf die Haut. ADICLAIR® auf die erkrankten Hautpartien auftragen.

#### 3.3 Dauer der Anwendung:

Bei der Behandlung von Hefeinfektionen müssen sämtliche Infektionsherde auf der Haut und den Schleimhäuten vollständig beseitigt werden, um Rückfälle zu vermeiden.

Nach Abklingen der Erkrankung sollte die Anwendung zur Sicherheit des Behandlungserfolges weitere 8–10 Tage fortgesetzt werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von ADICLAIR® zu stark oder zu schwach ist.

#### 3.4 Wenn Sie eine größere Menge ADICLAIR® angewendet haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal ADICLAIR® häufiger als vorgesehen angewendet haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Anwendung so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

#### 3.5 Wenn Sie die Anwendung von ADICLAIR® vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, sondern setzen Sie die Anwendung so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch ADICLAIR® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>sehr häufig:</b>	mehr als 1 von 10 Behandelten	<b>häufig:</b>	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>gelegentlich:</b>	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten	<b>selten:</b>	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<b>sehr selten:</b>	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, oder unbekannt		

#### 4.1 Mögliche Nebenwirkungen:

Das in ADICLAIR® enthaltene Nystatin wird bei äußerlicher Anwendung im Allgemeinen gut vertragen. In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen setzen Sie ADICLAIR® bitte ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### 5. Wie ist ADICLAIR® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis, welches die Salbe enthält, angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Aufbewahrungsbedingungen:** Nicht über 25 °C lagern!

**Hinweise auf die Haltbarkeit nach Anbruch:** Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate

### 6. Weitere Informationen

#### 6.1 Was ADICLAIR® enthält:

Der Wirkstoff ist: Nystatin  
1 g Salbe enthält: 100.000 I.E. Nystatin.

*Die sonstigen Bestandteile sind:*

Dickflüssiges Paraffin, Zinkoxid, Polyethylen

#### 6.2 Wie ADICLAIR® aussieht und Inhalt der Packung:

*Aussehen:* Hellgelbe, homogene Salbe

*Packungen:*

Originalpackung mit 20 g Salbe (N1)

Originalpackung mit 50 g Salbe (N2)

Originalpackung mit 100 g Salbe (N3)

#### 6.3 Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

ARDEYPHARM GmbH · Loerfeldstraße 20 · 58313 Herdecke · www.ardeypharm.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2009.**